Proyecto de pasantía

Estudio de Distancias en Cosmología

Lic. María Gabriela Arteaga García
Tutor: Dr. Alejandro Guarnizo Trilleras

Universidad Central de Venezuela - Universidad Antonio Nariño

6 de diciembre de 2022

Latin American alliance for
Capacity building in Advanced physics
LA-CoNGA physics

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea

Estado del arte

Objetivos

Metodología

Cosmología

Distancias en Cosmología

Módulo de Distancia

Estado del arte

Ecuaciones de campo de Einstein:

$$R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}Rg_{\alpha\beta} = \kappa T_{\alpha\beta}, \quad \kappa = 8\pi G \quad (1)$$

Homogeneidad e isotropía del Universo

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \right] \quad (2)$$

Objetivos

* **Objetivo General**

Estudiar el problema de las distancias en cosmología.

Metodología

1. **Afianzar principios en Relatividad General:** Las referencias a utilizar para este tema son:
 - ❖ S. Dodelson, *Modern cosmology*. Elsevier, 2003.

1. **Afianzar principios en Relatividad General:** Las referencias a utilizar para este tema son:
 - ❖ S. Dodelson, *Modern cosmology*. Elsevier, 2003.
2. **Modelo estándar de cosmología:** Las referencias ha usar para este tema son
 - ❖ S. Weinberg, *Cosmology*. OUP Oxford, 2008.
 - ❖ S. Dodelson, *Modern cosmology*. Elsevier, 2003.

1. **Afianzar principios en Relatividad General:** Las referencias a utilizar para este tema son:
 - ❖ S. Dodelson, *Modern cosmology*. Elsevier, 2003.
2. **Modelo estándar de cosmología:** Las referencias ha usar para este tema son
 - ❖ S. Weinberg, *Cosmology*. OUP Oxford, 2008.
 - ❖ S. Dodelson, *Modern cosmology*. Elsevier, 2003.
3. **Distancias en cosmología:** Las referencias a usar para este tema son:
 - ❖ S. Weinberg, *Cosmology*. OUP Oxford, 2008.
 - ❖ D. W. Hogg, “Distance measures in cosmology,” arXiv:astro-ph/9905116.
 - ❖ R. Kayser, P. Helbig, and T. Schramm, “A general and practical method for calculating cosmological distances,” *Astron. Astrophys.* 318 (1997) 680–686, arXiv:astro-ph/9603028

Módulo de distancia

El set de datos del modulo de distancia de supernovas tipo Ia fue el Union 2.1

```
Clear[dataSN, zdata, mdata, sigdata, c]
borra
dataSN = Import["Cat3_0mod.txt", "Table"];
importa
zdata = dataSN[[All, 2]];
todo
mdata = dataSN[[All, 3]];
todo
sigdata = dataSN[[All, 4]];
todo
lendata = Length[zdata];
longitud
zmaxSN = Max[zdata];
máximo
fitSN = Table[{dataSN[[i, 2]], dataSN[[i, 3]]}, {i, 1, lendata}];
tabla
SNTap1 = Table[{dataSN[[i, 2]], Around[dataSN[[i, 3]], sigdata[[i]]]}, {i, 1, lendata}];
tabla
valor con incertidumbre
ep = ListPlot[SNTap1, PlotStyle -> {Green, Opacity[.2]}, PlotMarkers -> {Automatic, Tiny}, Frame -> True, PlotRange -> Automatic,
representación de lista estilo de repre... verde opacidad marcadores de re... automático tamañ... marco verd... rango de rep... automático
ImageSize -> 500];
tamaño de imagen
Show[ep, mp]
muestra
```

MATHEMATICA 13

Cosmología

La evolución del factor de escala

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{k}{a^2} \quad (3)$$

Expresando la densidad de energía ρ y la presión p como una combinación de materia y radiación

$$H^2 = \frac{\kappa}{3}(\rho_m + \rho_r) - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda}{3}, \quad (4)$$

Siendo $H = \frac{\dot{a}}{a}$ el parámetro de Hubble.

Definiendo las densidades de energía de cada componente

$$\Omega_{m0} \equiv \frac{\kappa\rho_m}{3H_0^2}, \quad \Omega_{r0} \equiv \frac{\kappa\rho_r}{3H_0^2}, \quad \Omega_{k0} \equiv -\frac{k}{H_0^2 a^2}, \quad \Omega_\Lambda \equiv \frac{\Lambda}{3H_0^2} \quad (5)$$

La relación entre el corrimiento al rojo y el factor de escala esta dada por:

$$1 + z = \frac{a(t_0)}{a(t_1)}, \quad (6)$$

Finalmente podemos escribir la primera ecuación de Friedmann como:

$$\boxed{H^2(z) = H_0^2 [\Omega_{m0}(1+z)^3 + \Omega_{r0}(1+z)^4 + \Omega_{k0}(1+z)^2 + \Omega_\Lambda]} \quad (7)$$

Distancias en Cosmología

La **distancia comóvil** esta está definida como:

$$\chi(z) = \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{H(z')} . \quad (8)$$

donde c es la velocidad de la luz en el vacío y H_0 es la constante de Hubble actual. La **distancia diametral angular** d_A la podemos definir usando $\chi(z)$ como:

$$d_A(z) \equiv \frac{\chi(z)}{1+z} . \quad (9)$$

La **distancia de luminosidad** d_L se pueden calcular a través del flujo que emite un objeto dada su luminosidad. La podemos definir como:

$$d_L(z) = (1+z)\chi(z) . \quad (10)$$

Distancias en cosmología

Módulo de Distancia

Módulo de Distancia

$$\mu \equiv m - M = 5 \log(d_L) + 25, \quad (11)$$

siendo m la magnitud aparente y M la magnitud absoluta de un objeto.

Supernovas tipo Ia

Este tipo de supernova funciona como candelas estándar ya que tienen la misma luminosidad máxima no importa el lugar en el universo donde se encuentren.

Modelo w CDM

$$H(z) = \sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_{DE}(1+z)^{3+3w}} \quad (12)$$

donde para un universo plano debe cumplirse

$$\Omega_m + \Omega_{DE} = 1$$

De manera que:

$$H(z) = \sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + (1 - \Omega_m)(1+z)^{3+3w}} \quad (13)$$

Resolviendo la conservación del momento usando la ecuación de estado $p = w\rho$

$$\rho = a^{-3w-3} \quad (14)$$

- ▶ Polvo: $w = 0 \rightarrow \rho \propto a^{-3}$
- ▶ Radiación: $w = -1/3 \rightarrow \rho \propto a^{-4}$
- ▶ Vacío: $w = -1 \rightarrow \rho = \text{constante}$

Modelo w CDM

<http://laconga.redclara.net>

contacto@laconga.redclara.net

lacongaphysics

Latin American alliance for
Capacity building in Advanced physics

LA-CoNGA physics

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

La homogeneidad e isotropía del universo requieren que

$$T^{\mu\nu} = \text{diag}(-\rho, p, p, p) \quad (15)$$

La conservación del momento es $\dot{\rho} + 3\frac{\dot{a}}{a}(p + \rho) = 0$. Usando la ecuación de estado $p = wp$ resolvemos la ecuación